



część I kodu resortowego: 28-00593
część V kodu resortowego: 01
część VII kodu resortowego: 071

SZPITAL POWIATOWY im. Jana Mikulicza w Biskupcu
Oddział Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą
11 – 300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8
woj. warmińsko – mazurskie
Tel. 89/ 715-62 -55 lub 89/ 715-62 03
Koordynator: Andrzej Masal

Biskupiec 01.03.2012
L.Ks.Gł.1493-386 -2012
Data przyjęcia:27.02.2012
Data wypisu:01.03.2012

KARTA INFORMACYJNA leczenia szpitala

Nazwisko i imię: **MASZOTA KLAUDIA** P: **98120604685**
Adres: **KORPELE 25/ 26 A gm. SZCZYTNO**

ROZPOZNANIE

OSTRY BRZUCH. ICD 10 – R10.0
INFEKCJA UKŁADU MOCZOWEGO.
MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIECE.

STAN PO OPERACJI GUZA MÓZGU I TORBIEL TYLNEJ JAMY CZASZKI.

Wyniki badań pracownianych:

Morfologia: HCT- 39,2	HGB-13,6	RBC-4,32	WBC-10,15	MCV-90,7	PLT-303
HCT- 36,2	HGB-12,4	RBC-3,94	WBC-6,81	MCV-91,9	PLT-288

CRP; 2,4 mg/ l

Sód; 133 mmol/l

Potas; 4,0 mmol/l

Chlorki; 99 mmol/l

Mocz: żółty, mętny, c.wł.-1,010, pH-7,0, leu (-), Azo(-), białko ślad, cukier – norma, ket(-), Uro.- norma, bilirubina(-), erytr.(-)

Osad moczu; nabłonki płaskie bardzo liczne; fosforany bezpostaciowe bardzo liczne

Mocz: żółty, przejrzysty, c.wł.-1,015, pH-6,5, leu +, Azo pos, białko ślad, cukier – norma, ket(-), Uro.- norma, bilirubina(-), erytr.(-)

Osad moczu; nabłonki płaskie poj.; 1 1-3 wpw; nieliczne bakterie

Posiew moczu; Klebsiella pneumoniae. Wrażliwe na: Trimetoprim/ sulfametoksazol, Amikacyna, Netylmycyna, Gentamycyna, Cefazydym, Cefotaksym, Cefuroksym, Cefaleksyna,

Rtg jamy brzusznej 29.02.2012 r.; Bardzo drobne zwapnienia w częściach miękkich po stronie lewej – możliwe, że w nerce lewej. Poza tym zdjęcie jamy brzusznej bez zmian rtg. / lek. K. Rogoś /

Usg jamy brzusznej 28.02.2012 r.; Trzustka i aorta brzuszna częściowo przysłonięte gazami. Pęcherzyk żółciowy bez złożeń. Drogi żółciowe nieposzerzone. Wątroba bez zmian ogniskowych. Nieznacznie poszerzony UKM nerki prawej, nieco bardziej lewej. Poza tym obie nerki bez zmian w usg. Śledziona niepowiększona. Bardzo duża ilość moczu w pęcherzu moczowym. / lek. K. Rogoś /

Zastosowane leczenie:

Zachowawcze – farmakologiczne + diagnostyka.

Epikryza

Przyjęta do Oddziału z objawami ostrego brzucha. W chwili przyjęcia cierpiąca. Dziecko z bardzo ograniczonym kontaktem ze względu na MPDz i głęboką dysfunkcję CUN. W badaniu przedmiotowym stwierdzono ból brzucha-z parciem na mocz. Ze względu na utrudnioną mikcję i zaleganie moczu w pęcherzu moczowym (USG) założono cewnik Foleya. W okresie hospitalizacji kilkakrotnie obserwowano incydenty bólowe. Zastosowano leczenie farmakologiczne uzyskując ustąpienie dolegliwości bólowych. Wypisana do domu z zaleceniami:

Doraźne opróżnianie pęcherza – cewnikowanie.

Kontrola w Por. Lek. Rodzinnego.

Rp. Biseptol 2 x 600 mg przez 10 dni

Scopolan 1 czopek doraźnie.

Lekarz leczący:

KRZYSZTOF CYMULAK
specjalista chirurgii dziecięcej
438299A

KAZIMIERZ OLEJARZ
specjalista chirurgii dziecięcej
Ordynator oddziału log-ortopeda
2064982